

GGD Amsterdam

Screening for brain injury in a population of violent frequent offenders

Thijs Fassaert, Christel Grimbergen Amsterdam Public Health Service

LEPH2019
Session C20, 22 October 2019



Top 600 approach

- Crime rates fall throughout the Western world
 - A small but still significant group of criminals who are responsible for a large number of violent incidents with high impact on victims, media
- The Top600 approach was established in 2011 by the former mayor:
 - Diversion program
 - More than 40 organisations working together
 - One goal: behavioural change, reduce crime



Specific tasks Public Health Service (GGD)

- To screen for psychosocial problems (N=1000+)
 - All on a voluntary basis.
- Clarify medical en psychiatric history
- Organise treatment advice with main providers
- Refer and guide to appropriate care
- Support partner organisations such as police with advice about how to approach clients
- Research, inform policy makers







Mild/bordeline intellectual disability (MBID)

- Major issue from the start
 - 2012: MBID <u>established</u> in 20.8% (Nt=120), <u>indications</u> found in another 26.7%. <u>> structural screening was implemented.</u>
 - 2019: prevalence based on structural screening >50%
- There's no single cause of functioning on MBID level
 - Just as there's no single outcome for the disability.
 - Distinguishing between causes relevant for plan of action





Acquired brain injury (ABI)?

- A disruption in the normal function of the brain that can be caused by a bump, blow, or jolt to the head, or penetrating head injury (source: CDC).
- Serious public health concern
 - E.g. Netherlands: 645.900 individuals in general practice with some form of brain injury (RIVM, 2016)
 - Even more so in forensic settings, estimates differ depending on specific methodology/definitions.
 - 31% 86% (Allely et al. 2016)
 - Underreporting



Our goals



"It looks like someone tried to pronounce 'Rorschach' with a mouthful of soup."

Primary

- To screening for ABI in Top6oo and filter out people with clinically relevant symptoms of ABI
 - Differentiate from MBID
 - Refer people for further diagnostics and appropriate help

Secondary

- Create awareness in the field of forensic care providers
- Stimulate development of new services







- Select items in screening tool & analyze
- "Have you ever been hospitalized or received treatment for a somatic problem?"
 - ~70% answers "yes"
- Not informative





Introduced more specific questions (2017)

- "Have you ever been uncounscious?"
- -1/3 'yes' (N=50)
- Explanations:
 - Traffic acidents, shootings, fights, drugrelated accidents, complications related to somatic conditions (e.g. diabetes), etc.

- "Have you ever had a concussion?"
- -1/5 'yes' (N=50)
- Explanations:
 - Abuse (brick or vase on head), traffic accidents, accidents in playground, fights, etc.

 Better, yet insufficient to come up with a working diagnosis and <u>referral</u>




Final step: full screener

- Literature search
 - Existing instruments: too long
 - Max. 90 minutes, including all other topics (social, housing, finances, etc.)
- Structured screening in several conditional steps
 - Events
 - In case of events: (residue) symptoms
 - In case of 5+ symptoms: elaboration (e.g. frequency, coma duration, amnesia, etc.)
 - Specific cognitive impairments
 - Montreal Cognitive Assessment (MOCA)
- Brief Amsterdam Problemlist for Brain Injury
 - Dutch abbreviation: KAP NAH (Dutch acronym: "piss off")









A GEBEURTENISSEN

B COGNITIEVE SYMPTOMEN




leb je wel eens een klap op je hoofd gehad of een verwonding:		Instructie: Leg uit dat we uitsluitend op zoek zijn naansymptomen die zijn ontstaan/ verergerd door gebeurtenis deel A.		Personalia
1.	door ongeluk met auto, bus, vrachtwagen, motor of terreinwagen	☐ Meer moeite met lezen, schrijven, rekenen/wiskunde	Naam	
2.	door aangereden te zijn als voetganger door een voertuig	☐ Meer moeite met spraak (uitspraak, articuleren)	Nummer T1000	
3.	doordat je op je hoofd werd geraakt door een vallend voorwerp	☐ Snel verdwalen op onbekende plekken	A CONTRACTOR AND A CONT	
4.	doordat je tegen het hoofd werd geslagen met een voorwerp	☐ Meer moeite met school of werk	Geboortedatum	ž.
5-	doordat je van de trap bent gevallen	□ Verward raken op bekende piekken		
6.	doordat je van grote hoogte ergens vanaf bent gevallen	☐ Moeite om dingen te plannen	Geslacht	
7.	doordat je bewusteloos raakte en op je hoofd viel	☐ Moeite om nieuwe informatie aan te leren	Gesidene	
8.	doordat je viel door een black-out na gebruik drugs of drank	☐ Moeite met afhandelen administratie of organisatie persoonlijke zaken	Invuldatum	*
9-	doordat je bent gevallen met de fiets of tijdens het fietsen	☐ Je neemt snel beslissingen zonder over consequenties na te denken		
10.	doordat je bent gevallen met (rol)schaatsen, inline skaten of	☐ Snel afgeleid	Opleidings-	5)
	skateboarden	☐ Vergeten of missen van afspraken	niveau	
11.	doordat je aan je hoofd werd geraakt tijdens het sporten	□ Telefoonnummers vergeten	Score SCIL	*
	(bv. voetbal, basketbal, vechtsporten enz.)	Vergeten om te gaan werken of om je dagelijkse taken en/of huiswerk te doen	Score Seiz	
	doordat je als kind in de speeltuin bent gevallen op je hoofd	2 Vergeten wat je hebt gelezen	Afnameduur	0
13.	doordat je een hoofdwond opliep tijdens het duiken in (ondiep) water	□ Denken gaat langzamer	Amantedoor	
14.	doordat je in een overval of vechtpartij terecht kwam	Moeite om aanwijzingen op te volgen		
15.	doordat je lichamelijk bent mishandeld	Je gedachten niet kunnen focussen		
16.	anders, namelijk	Vergeten wat voor dingen je hebt gedaan die dag Vergeten apparaten (bv. laptop, televisie of Wi-Fi op je telefoon) uit te zetten		
leb of ben je ooit:		Moente hebben om een gesprek gaande te houden of te volgen Te snel of te langzaam denken		
17.	zuurstoftekort gehad bij je geboorte	☐ Moeite hebben om (zonder conflicten) met mensen om te gaan		
18.	bijna verdronken	☐ Vakerflast hebben van duizeligheid		
19.	een hartinfarct gehad	DiMoeite met problemen oplossen		
20.	geprobeerd zelfmoord te plegen/jezelf opgehangen	Sneller geïrriteerd, een 'korter lontje'		
21.	een hersenbloeding gehad	- smaller gammacia, can horizon torrige		
22.	jezelf gewurgd of laten wurgen tijdens de seks			
	anders, namelijk			
	ositieve items deel A:	Aantal positieve items deel B:	1	
ndien to	taal - o Ston	Indien totaal cr Ston	1	





Montreal Cognitive Assessment





Thank you!

- tfassaert@ggd.amsterdam.nl
- Altrecht, division neuropsychiatry (F. Jonker)
- De Waag, forensic health care; F. Kuijpers, J. van Horn)
- VU University (clinical neuropsychology; S. Noordermeer, M. Milders)
- UMC Amsterdam (prof. dr. A. Popma)
- Public health service (Esmee Scheij and the Top6oo team)
- Amsterdam municipality (R. Lindenberg)











